

Отборочный (заочный) онлайн-этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
по общеобразовательному предмету Химия

**8, 9 классы**

**Вариант 1**

1. Отношение молярных масс йодида металла и его оксида равно 2,849. Определите неизвестный металл, если известно, что в данных соединениях он имеет валентность III. В ответе запишите химический символ неизвестного металла.
2. Смесь кислорода с озоном называют озонированным кислородом. После разложения всего озона, объем смеси увеличился на 5%. Вычислите содержание озона (в % по объему) в исходной смеси.
3. Какую массу воды (г) следует взять, чтобы при растворении в ней строго необходимой навески калия можно получить 140 г раствора гидроксида калия с массовой долей 0,1?
4. Имеется смесь, содержащая по 0,6 моль каждого из веществ:  $\text{HgO}$ ,  $\text{KMnO}_4$ ,  $\text{KClO}_3$ ,  $\text{KNO}_3$ . Рассчитайте общий объем (л) кислорода (н.у.), который может выделиться при нагревании такой смеси.
5. Имеется 105 г раствора с массовой долей гидрокарбоната натрия 9,6%. Этот раствор прокипятили и после охлаждения добавили раствор с массовой долей хлорида кальция 12% ( $\rho = 1,11$  г/мл). Рассчитайте, какой объем (мл) раствора хлорида кальция может прореагировать с полученным после кипячения раствором? Испарением воды можно пренебречь.
6. Образец минерала магнезита ( $\text{MgCO}_3$ ) массой 135 г, содержащий 44% пустой породы, подвергли обжигу. Газ, выделившийся при обжиге этого образца, пропустили через раствор, полученный при растворении 50 г металлического натрия в 200 мл воды. Определите массовую долю (%) образовавшейся соли в растворе.
7. Смесь металлов, состоящую из 39 г цинка и 11,2 г железа, нагрели с избытком серы. Полученные продукты реакции растворили в избытке раствора соляной кислоты. Выделившийся газ полностью поглотили раствором ( $\rho = 1,12$  г/см<sup>3</sup>), с массовой долей сульфата меди (II) 12%. Какой объем (мл) раствора сульфата меди был затрачен на поглощение этого газа?

**Решение варианта 1**

1. Химические формулы хлорида и оксида металла  $MeI_3$ ;  $Me_2O_3$ .

Молярные массы таких соединений  $M(MeI_3) = A_r(Me) + 127 \cdot 3$ ;  $M(Me_2O_3) = A_r(Me) \cdot 2 + 16 \cdot 3$ .

Тогда соотношение молярных масс таких соединений будет

$$2,849 = \frac{A_r(Me) + 127 \cdot 3}{A_r(Me) \cdot 2 + 16 \cdot 3} = \frac{A_r(Me) + 381}{A_r(Me) \cdot 2 + 48} \Rightarrow 5,698 \cdot A_r(Me) + 136,752 = A_r(Me) + 381$$

$$4,698 \cdot A_r(Me) = 244,248 \Rightarrow A_r(Me) \approx 52.$$

Неизвестный металл Me хром Cr.

**Ответ.** Cr

2. Уравнение химической реакции  $2 O_3 \rightarrow 3 O_2$



Предположим, что у нас есть 100 л озонированного кислорода.

По условию задания, увеличение объема после разложения всего озона в смеси

100 л – 100 % объема

$$X \text{ л} \quad \text{---} \quad 105 \% \text{ объема} \Rightarrow X = \frac{100 \text{ л} \cdot 105\%}{100\%} = 105 \text{ л. Увеличение объема } \Delta V = 5 \text{ л.}$$

Увеличение объема смеси происходит при разложении озона, тогда исходя из

уравнения реакции  $2 \text{ л } O_3 - 3 \text{ л } O_2$  или  $\Delta V = 1 \text{ л}$

по условию  $Y \text{ л } O_3 \quad \text{---} \quad \Delta V = 5 \text{ л}$

$$Y = \frac{2 \text{ л} \cdot 5 \text{ л}}{1} = 10 \text{ л}$$


увеличение объема при распаде озона равно половине исходного объема озона.

Объемная доля содержания озона  $\varphi$

$$\varphi = \frac{V_{O_3} \cdot 100\%}{V_{\text{смеси}}} = \frac{10 \cdot 100\%}{100} = 10\%$$

**Ответ.** 10

3. Уравнение химической реакции взаимодействия калия с водой



Масса гидроксида калия в растворе

$$m(KOH) = 140 \cdot 0,1 = 14 \text{ г, тогда}$$

$$M(KOH) = 56 \text{ г/моль}$$

$$v(KOH) = \frac{m(KOH)}{M(KOH)} = 14/56 = 0,25 \text{ моль}$$

Количество вещества и масса калия, которую необходимо добавить в раствор

$v(K) = v(KOH) = 0,25$  моль (по уравнению реакции), тогда

$$m(K) = M(K) \cdot v(K) = 39 \cdot 0,25 = 9,75 \text{ г} \quad M(K) = 39 \text{ г/моль}$$

Количество вещества и масса водорода, которое выделится из раствора

$$v(H_2) = 1/2 v(K) = 0,5 \cdot 0,25 = 0,125 \text{ моль; } m(H_2) = v(H_2) \cdot M(H_2) = 0,125 \cdot 2 = 0,25 \text{ г.}$$

$$m(p\text{-ра}) = 140 \text{ г} = m(H_2O) + m(K) - m(H_2)$$


$$M(H_2) = 2 \text{ г/моль}$$

$$m(H_2O) = m(p\text{-ра}) - m(K) + m(H_2) = 140 - 9,75 + 0,25 = 130,5 \text{ г}$$

**Ответ.** 130,5

Отборочный (заочный) онлайн-этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
по общеобразовательному предмету Химия


4. Уравнения реакций



0,6 моль ————— 0,3 моль



0,6 моль ————— 0,3 моль



0,6 моль ————— 0,9 моль



0,6 моль ————— 0,3 моль

Из 0,6 моль  $\text{KClO}_3$  выделяется 0,9 моль  $\text{O}_2$ , а из 0,6 моль каждого из остальных трёх веществ по 0,3 моль  $\text{O}_2$ .

Расчёт общего количества выделившегося кислорода

$$v_{\text{общее}}(\text{O}_2) = v_{\text{HgO}}(\text{O}_2) + v_{\text{KMnO}_4}(\text{O}_2) + v_{\text{KClO}_3}(\text{O}_2) + v_{\text{KNO}_3}(\text{O}_2) = 0,3 + 0,3 + 0,9 + 0,3 = 1,8 \text{ моль.}$$

Расчёт общего объема выделившегося кислорода

$$V_{\text{общее}}(\text{O}_2) = v_{\text{общее}}(\text{O}_2) \cdot V_m; V_{\text{общее}}(\text{O}_2) = 1,8 \text{ моль} \cdot 22,4 \text{ л/моль} = 40,32 \text{ л.}$$

**Ответ.** 40,32

5. Масса и количество гидрокарбоната натрия в исходном растворе

$$m(\text{NaHCO}_3) = \frac{m_{\text{р-р}}(\text{NaHCO}_3) \cdot w(\text{NaHCO}_3)}{100\%} = \frac{105 \cdot 9,6}{100} = 10,08 \text{ г}$$

$$v(\text{NaHCO}_3) = 10,08 / 84 = 0,12 \text{ моль}$$

$$M(\text{NaHCO}_3) = 84 \text{ г/моль}$$

Уравнение химической реакции, протекающей при кипячении раствора




2 моль — 1 моль ————— 1 моль

Масса и количество карбоната натрия в полученном растворе

$$v(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 0,5 \cdot v(\text{NaHCO}_3) = 0,06 \text{ моль};$$

Уравнение химической реакции взаимодействия карбоната натрия с хлоридом кальция



1 моль — 1 моль

Количество и масса хлорида кальция, взаимодействующего с карбонатом натрия

$$v(\text{Na}_2\text{CO}_3) = v(\text{CaCl}_2) = 0,06 \text{ моль};$$

$$M(\text{CaCl}_2) = 111 \text{ г/моль}$$

$$m(\text{CaCl}_2) = v(\text{CaCl}_2) \cdot M(\text{CaCl}_2) = 0,06 \cdot 111 = 6,66 \text{ г}$$

Масса и объем раствора хлорида кальция, взаимодействующего с карбонатом натрия

$$m_{\text{р-р}}(\text{CaCl}_2) = \frac{m(\text{CaCl}_2) \cdot 100\%}{w(\text{CaCl}_2)} = \frac{6,66 \cdot 100}{12} = 55,5 \text{ г}$$

$$V(\text{CaCl}_2)_{\text{р-р}} = m / \rho = 55,5 : 1,11 \approx 50 \text{ мл}$$

**Ответ.** 50

Отборочный (заочный) онлайн-этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
по общеобразовательному предмету Химия

6. Определение массы и количества карбоната магния, содержащееся в 135 г магнезита

$$w(\text{MgCO}_3) = 100 - 44 = 56\%$$

$$w(\text{MgCO}_3) = \frac{m(\text{MgCO}_3) \cdot 100\%}{m_{\text{магнезита}}} \Rightarrow m(\text{MgCO}_3) = \frac{w(\text{MgCO}_3) \cdot m_{\text{магнезита}}}{100\%} = \frac{56 \cdot 135}{100} = 75,6 \text{ г.}$$

Расчёт количества и массы выделившегося оксида углерода (IV) при обжиге

$$v(\text{MgCO}_3) = 75,6 : 84 = 0,9 \text{ моль}$$

$$M(\text{MgCO}_3) = 84 \text{ г/моль}$$




$$1 \text{ моль} \quad \text{---} \quad 1 \text{ моль}$$

$$M(\text{CO}_2) = 44 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{CO}_2) = v(\text{MgCO}_3) = 0,9 \text{ моль} \quad m(\text{CO}_2) = 44 \cdot 0,9 = 39,6 \text{ г}$$

Определение избытка вещества в реакции натрия с водой



$$v(\text{Na}) = 50/23 \approx 2,17 \text{ моль}$$


$$M(\text{Na}) = 23 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{H}_2\text{O}) = 200/18 \approx 11,11 \text{ моль}$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{Na}) = 2,17 \text{ моль} < v(\text{H}_2\text{O}) \approx 11,11 \text{ моль} \Rightarrow \text{вода в избытке,}$$

Вычисление количества гидроксида натрия и массы выделившегося водорода при взаимодействии натрия с водой




$$2 \text{ моль} \quad \text{---} \quad 2 \text{ моль} \quad \text{---} \quad 1 \text{ моль}$$

$$v(\text{NaOH}) = v(\text{Na}) = 2,17 \text{ моль}$$

$$M(\text{H}_2) = 2 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{H}_2) = 1/2 \cdot v(\text{Na}) \approx 1,09 \text{ моль}; \quad m(\text{H}_2) = 1,09 \cdot 2 \approx 2,17 \text{ г}$$

Определим состав и количество продукта взаимодействия оксида углерода (IV) и гидроксида натрия



$$1 \text{ моль} \quad \text{---} \quad 2 \text{ моль}$$


$$0,9 \text{ моль} \rightarrow 2 \cdot 0,9 \text{ моль} = 1,8 \text{ моль}$$

Из уравнения реакции следует: для реакции с 0,9 моль  $\text{CO}_2$  требуется 1,8 моль  $\text{NaOH}$ , т.е.

$$v_{\text{нужное}}(\text{NaOH}) = 2 \cdot v(\text{CO}_2) = 1,8 \text{ моль}$$

По условию, количество  $v_{\text{по условию}}(\text{NaOH}) = 2,17 \text{ моль}$ , т.е.

$v_{\text{нужное}}(\text{NaOH}) = 2 \cdot v(\text{CO}_2) = 1,8 \text{ моль} < v_{\text{по условию}}(\text{NaOH}) = 2,17 \text{ моль}$ , следовательно,  $\text{NaOH}$  в избытке и образуется средняя соль – карбонат натрия



$$1 \text{ моль} \quad \text{---} \quad \text{избыток} \quad \text{---} \quad 1 \text{ моль}$$

$$M(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 106 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{Na}_2\text{CO}_3) = v(\text{CO}_2) = 0,9 \text{ моль}; \quad m(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 106 \cdot 0,9 = 95,4 \text{ г}$$

Определим массу и массовую долю карбоната натрия в растворе

$$m_{\text{р-р}}(\text{NaOH}) = m(\text{Na}) + m(\text{H}_2\text{O}) - m(\text{H}_2) = 50 + 200 - 2,17 = 247,83 \text{ г}$$

$$m_{\text{р-р}} = m_{\text{р-р}}(\text{NaOH}) + m(\text{CO}_2) = 247,83 + 39,6 = 287,43 \text{ г}$$

$$w(\text{Na}_2\text{CO}_3) = \frac{m(\text{Na}_2\text{CO}_3)}{m_{\text{р-р}}} \cdot 100\% = \frac{95,4 \cdot 100}{287,43} \approx 33,19 \%$$

**Ответ.** 33,19

Отборочный (заочный) онлайн-этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
по общеобразовательному предмету Химия

7.



Уравнение реакции металлов с серой и расчет количества образовавшихся веществ  $v = \frac{m}{M}$

$$v(\text{Zn}) = 39/65 = 0,6 \text{ моль}$$

$$M(\text{Zn}) = 65 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{Fe}) = 11,2/56 = 0,2 \text{ моль}$$

$$M(\text{Fe}) = 56 \text{ г/моль}$$




Уравнение реакции сульфидов с соляной кислотой и расчет количества образовавшихся веществ



Общее количество сероводорода по двум реакциям

$$v(\text{H}_2\text{S}) = v_1(\text{H}_2\text{S}) + v_2(\text{H}_2\text{S}) = 0,6 + 0,2 = 0,8 \text{ моль}$$

Уравнение реакции сероводорода с сульфатом меди и расчет массы образовавшегося осадка



$$v(\text{H}_2\text{S}) = v(\text{CuSO}_4) = 0,8 \text{ моль}$$

$$m(\text{CuSO}_4) = 160 \cdot 0,8 = 128 \text{ г}$$

$$M(\text{CuSO}_4) = 160 \text{ г/моль}$$

Расчет массы и объема раствора сульфата меди

$$m_{\text{р-р}}(\text{CuSO}_4) = \frac{m(\text{CuSO}_4)}{w(\text{CuSO}_4)} \cdot 100\% = \frac{128}{12} \cdot 100 \approx 1066,67 \text{ г}$$

$$V_{\text{р-р}}(\text{CuSO}_4) = \frac{m_{\text{р-р}}(\text{CuSO}_4)}{\rho} = \frac{1066,67}{1,12} = 952,38 \text{ мл}$$

**Ответ.** 952,38

Отборочный (заочный) онлайн-этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
по общеобразовательному предмету Химия

**8, 9 классы**

**Вариант 2**

1. Отношение молярных масс хлорида металла и его оксида равно 2,375. Определите неизвестный металл, если известно, что в данных соединениях он имеет валентность IV. В ответе запишите химический символ неизвестного металла.
2. Смесь кислорода с озоном называют озонированным кислородом. После разложения всего озона, объем смеси увеличился на 4%. Вычислите содержание озона (в % по объему) в исходной смеси.
3. Какую массу воды (г) следует взять, чтобы при растворении в ней строго необходимой навески кальция можно получить 95 г раствора гидроксида кальция с массовой долей 0,148?
4. Имеется смесь, содержащая по 0,4 моль каждого из веществ:  $\text{HgO}$ ,  $\text{KMnO}_4$ ,  $\text{KClO}_3$ ,  $\text{KNO}_3$ . Рассчитайте общий объем (л) кислорода (н.у.), который может выделиться при нагревании такой смеси.
5. Имеется 196 г раствора с массовой долей гидрокарбоната натрия 6%. Этот раствор прокипятили и после охлаждения добавили раствор с массовой долей хлорида магния 9,5% ( $\rho = 1,12$  г/мл). Рассчитайте объем (мл) раствора хлорида магния, который может прореагировать с полученным после кипячения раствором? Испарением воды можно пренебречь.
6. Образец минерала цинкового шпата ( $\text{ZnCO}_3$ ) массой 125 г, содержащий 20% пустой породы, подвергли обжигу. Газ, выделившийся при обжиге этого образца, пропустили через раствор, полученный при растворении 16,1 г металлического натрия в 200 мл воды. Определите массовую долю (%) образовавшейся соли в растворе.
7. Смесь металлов, состоящую из 26 г цинка и 33,6 г железа, нагрели с избытком серы. Полученные продукты реакции растворили в избытке раствора соляной кислоты. Выделившийся газ полностью поглотили раствором ( $\rho = 1,15$  г/см<sup>3</sup>), с массовой долей сульфата меди (II) 16%. Какой объем (мл) раствора сульфата меди был затрачен на поглощение этого газа?

**Решение варианта 2**

1. Химические формулы хлорида и оксида металла  $\text{MeCl}_4$ ;  $\text{MeO}_2$ .

Молярные массы таких соединений  $M(\text{MeCl}_4) = A_r(\text{Me}) + 35,5 \cdot 4$ ;  $M(\text{MeO}_2) = A_r(\text{Me}) + 16 \cdot 2$ .

Тогда соотношение молярных масс таких соединений будет

$$2,375 = \frac{A_r(\text{Me}) + 35,5 \cdot 4}{A_r(\text{Me}) + 16 \cdot 2} = \frac{A_r(\text{Me}) + 142}{A_r(\text{Me}) + 32} \Rightarrow 2,375 \cdot A_r(\text{Me}) + 76 = A_r(\text{Me}) + 142$$

$$1,375 \cdot A_r(\text{Me}) = 66 \Rightarrow A_r(\text{Me}) = 48.$$

Неизвестный металл Me титан Ti.

**Ответ.** Ti

2. Уравнение химической реакции  $2 \text{O}_3 \rightarrow 3 \text{O}_2$   
2 л — 3 л

Предположим, что у нас есть 100 л озонированного кислорода.

По условию задания, увеличение объема после разложения всего озона в смеси  
100 л – 100 % объема

$$X \text{ л} - 104 \% \text{ объема} \Rightarrow X = \frac{100 \text{ л} \cdot 104\%}{100\%} = 104 \text{ л. Увеличение объема } \Delta V = 4 \text{ л.}$$

Увеличение объема смеси происходит при разложении озона, тогда исходя из  
уравнения реакции  $2 \text{ л O}_3 - 3 \text{ л O}_2$  или  $\Delta V = 1 \text{ л}$

по условию  $Y \text{ л O}_3 \text{ — } \Delta V = 4 \text{ л}$

$$Y = \frac{2 \text{ л} \cdot 4 \text{ л}}{1} = 8 \text{ л.}$$


увеличение объема при распаде озона равно половине исходного объема озона.

Объёмная доля содержания озона  $\varphi$

$$\varphi = \frac{V_{\text{O}_3} \cdot 100\%}{V_{\text{смеси}}} = \frac{8 \cdot 100\%}{100} = 8\%$$

**Ответ.** 8

3. Уравнение химической реакции взаимодействия кальция с водой



Масса гидроксида кальция в растворе

$$m(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 95 \cdot 0,148 = 14,06 \text{ г, тогда}$$

$$M(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 74 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{Ca}(\text{OH})_2) = \frac{m(\text{Ca}(\text{OH})_2)}{M(\text{Ca}(\text{OH})_2)} = 14,06/74 = 0,19 \text{ моль}$$

Количество вещества и масса кальция, которую необходимо добавить в раствор

$v(\text{Ca}) = v(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 0,19 \text{ моль}$  (по уравнению реакции), тогда

$$m(\text{Ca}) = M(\text{Ca}) \cdot v(\text{Ca}) = 40 \cdot 0,19 = 7,6 \text{ г} \quad M(\text{Ca}) = 40 \text{ г/моль}$$

Количество вещества и масса водорода, которое выделится из раствора

$$v(\text{H}_2) = v(\text{Ca}) = 0,19 \text{ моль; } m(\text{H}_2) = v(\text{H}_2) \cdot M(\text{H}_2) = 0,19 \cdot 2 = 0,38 \text{ г.}$$

$$m(\text{р-ра}) = 95 \text{ г} = m(\text{H}_2\text{O}) + m(\text{Ca}) - m(\text{H}_2)$$


$$M(\text{H}_2) = 2 \text{ г/моль}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = 95 - m(\text{Ca}) + m(\text{H}_2) = 95 - 7,6 + 0,38 = 87,78 \text{ г}$$

**Ответ.** 87,78

Отборочный (заочный) онлайн-этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
по общеобразовательному предмету Химия


4. Уравнения реакций




0,4 моль ————— 0,2 моль



0,4 моль ————— 0,2 моль



0,4 моль ————— 0,6 моль



0,4 моль ————— 0,2 моль

Из 0,4 моль  $\text{KClO}_3$  выделяется 0,6 моль  $\text{O}_2$ , а из 0,4 моль каждого из остальных трёх веществ по 0,2 моль  $\text{O}_2$ .

Расчёт общего количества выделившегося кислорода

$$v_{\text{общее}}(\text{O}_2) = v_{\text{HgO}}(\text{O}_2) + v_{\text{KMnO}_4}(\text{O}_2) + v_{\text{KClO}_3}(\text{O}_2) + v_{\text{KNO}_3}(\text{O}_2) = 0,2 + 0,2 + 0,6 + 0,2 = 1,2 \text{ моль.}$$

Расчёт общего объема выделившегося кислорода

$$V_{\text{общее}}(\text{O}_2) = v_{\text{общее}}(\text{O}_2) \cdot V_m; V_{\text{общее}}(\text{O}_2) = 1,2 \text{ моль} \cdot 22,4 \text{ л/моль} = 26,88 \text{ л.}$$

**Ответ.** 26,88

5. Масса и количество гидрокарбоната натрия в исходном растворе

$$m(\text{NaHCO}_3) = \frac{m_{\text{р-р}}(\text{NaHCO}_3) \cdot w(\text{NaHCO}_3)}{100\%} = \frac{196 \cdot 6}{100} = 11,76 \text{ г}$$

$$v(\text{NaHCO}_3) = 11,76 / 84 = 0,14 \text{ моль}$$

$$M(\text{NaHCO}_3) = 84 \text{ г/моль}$$

Уравнение химической реакции, протекающей при кипячении раствора




2 моль — 1 моль — 1 моль

Масса и количество карбоната натрия в полученном растворе

$$v(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 0,5 \cdot v(\text{NaHCO}_3) = 0,07 \text{ моль;}$$

Уравнение химической реакции взаимодействия карбоната натрия с хлоридом магния



1 моль — 1 моль

Количество и масса хлорида магния, взаимодействующего с карбонатом натрия

$$v(\text{Na}_2\text{CO}_3) = v(\text{MgCl}_2) = 0,07 \text{ моль;}$$

$$M(\text{MgCl}_2) = 95 \text{ г/моль}$$

$$m(\text{MgCl}_2) = v(\text{MgCl}_2) \cdot M(\text{MgCl}_2) = 0,07 \cdot 95 = 6,65 \text{ г}$$

Масса и объем раствора хлорида магния, взаимодействующего с карбонатом натрия

$$m_{\text{р-р}}(\text{MgCl}_2) = \frac{m(\text{MgCl}_2) \cdot 100\%}{w(\text{MgCl}_2)} = \frac{6,65 \cdot 100}{12} = 70 \text{ г}$$

$$V(\text{MgCl}_2)_{\text{р-р}} = m / \rho = 70 : 1,12 = 62,5 \text{ мл}$$

**Ответ.** 62,5



Отборочный (заочный) онлайн-этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
по общеобразовательному предмету Химия

6. Определение массы и количества карбоната цинка, содержащееся в 125 г цинкового шпата

$$w(\text{ZnCO}_3) = 100 - 20 = 80\%;$$

$$w(\text{ZnCO}_3) = \frac{m(\text{ZnCO}_3) \cdot 100\%}{m_{\text{цинкового шпата}}} \Rightarrow m(\text{ZnCO}_3) = \frac{w(\text{ZnCO}_3) \cdot m_{\text{цинкового шпата}}}{100\%} = \frac{80 \cdot 125}{100} = 100 \text{ г.}$$

Расчёт количества и массы выделившегося оксида углерода (IV) при обжиге

$$v(\text{ZnCO}_3) = 100 : 125 = 0,8 \text{ моль}$$

$$M(\text{ZnCO}_3) = 125 \text{ г/моль}$$




$$1 \text{ моль} \quad \text{---} \quad 1 \text{ моль}$$

$$M(\text{CO}_2) = 44 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{CO}_2) = v(\text{ZnCO}_3) = 0,8 \text{ моль} \quad m(\text{CO}_2) = 44 \cdot 0,8 = 35,2 \text{ г}$$

Определение избытка вещества в реакции натрия с водой



$$v(\text{Na}) = 16,1/23 = 0,7 \text{ моль}$$


$$M(\text{Na}) = 23 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{H}_2\text{O}) = 200/18 \approx 11,11 \text{ моль}$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{Na}) = 0,7 \text{ моль} < v(\text{H}_2\text{O}) \approx 11,11 \text{ моль} \Rightarrow \text{вода в избытке.}$$

Вычисление количества гидроксида натрия и массы выделившегося водорода при взаимодействии натрия с водой




$$2 \text{ моль} \quad \text{---} \quad 2 \text{ моль} \quad \text{---} \quad 1 \text{ моль}$$

$$v(\text{NaOH}) = v(\text{Na}) = 0,7 \text{ моль}$$

$$M(\text{H}_2) = 2 \text{ г/моль}$$

$$v(\text{H}_2) = 1/2 v(\text{Na}) = 0,35 \text{ моль}; \quad m(\text{H}_2) = 0,35 \cdot 2 = 0,7 \text{ г.}$$

Определим состав и количество продукта взаимодействия оксида углерода (IV) и гидроксида натрия



$$1 \text{ моль} \quad \text{---} \quad 1 \text{ моль}$$

$$0,7 \text{ моль} \quad \text{---} \quad 0,7 \text{ моль}$$

Из уравнения реакции следует: для реакции с 0,7 моль NaOH требуется 0,7 моль CO<sub>2</sub>.

По условию  $v_{\text{по условию}}(\text{CO}_2) = 0,8 \text{ моль}$ ,

т.е.  $v_{\text{по условию}}(\text{CO}_2) = 0,8 \text{ моль} > v_{\text{нужно}}(\text{NaOH}) = 0,7 \text{ моль}$ , следовательно, CO<sub>2</sub> в избытке и образуется кислая соль – гидрокарбонат натрия



$$M(\text{NaHCO}_3) = 84 \text{ г/моль}$$

$$\text{избыток} \quad \text{---} \quad 1 \text{ моль} \quad \text{---} \quad 1 \text{ моль}$$

$$v(\text{NaHCO}_3) = v(\text{NaOH}) = 0,7 \text{ моль}; \quad m(\text{NaHCO}_3) = 84 \cdot 0,7 = 58,8 \text{ г}$$

Определим массу и массовую долю карбоната натрия в растворе

$$m_{\text{р-р}}(\text{NaOH}) = m(\text{Na}) + m(\text{H}_2\text{O}) - m(\text{H}_2) = 16,1 + 200 - 0,7 = 215,4 \text{ г}$$

$$m_{\text{р-р}} = m_{\text{р-р}}(\text{NaOH}) + m(\text{CO}_2) = 215,4 + 35,2 = 250,6 \text{ г}$$

$$w(\text{NaHCO}_3) = \frac{m(\text{NaHCO}_3)}{m_{\text{р-р}}} \cdot 100\% = \frac{58,8 \cdot 100}{250,6} \approx 23,46 \%$$

**Ответ.** 23,46

Отборочный (заочный) онлайн-этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
по общеобразовательному предмету Химия

7.



Уравнение реакции металлов с серой и расчет количества образовавшихся веществ  $\nu = \frac{m}{M}$

$$\nu(\text{Zn}) = 26/65 = 0,4 \text{ моль}$$

$$M(\text{Zn}) = 65 \text{ г/моль}$$

$$\nu(\text{Fe}) = 33,6/56 = 0,6 \text{ моль}$$

$$M(\text{Fe}) = 56 \text{ г/моль}$$




Уравнение реакции сульфидов с соляной кислотой и расчет количества образовавшихся веществ



Общее количество сероводорода по двум реакциям

$$\nu(\text{H}_2\text{S}) = \nu_1(\text{H}_2\text{S}) + \nu_2(\text{H}_2\text{S}) = 0,4 + 0,6 = 1 \text{ моль}$$

Уравнение реакции сероводорода с сульфатом меди и расчет массы образовавшегося осадка



$$\nu(\text{H}_2\text{S}) = \nu(\text{CuSO}_4) = 1 \text{ моль}$$

$$m(\text{CuSO}_4) = 160 \cdot 1 = 160 \text{ г}$$

$$M(\text{CuSO}_4) = 160 \text{ г/моль}$$

Расчет массы и объема раствора сульфата меди

$$m_{\text{р-р}}(\text{CuSO}_4) = \frac{m(\text{CuSO}_4)}{w(\text{CuSO}_4)} \cdot 100\% = \frac{160}{16} \cdot 100 = 1000 \text{ г}$$

$$V_{\text{р-р}}(\text{CuSO}_4) = \frac{m_{\text{р-р}}(\text{CuSO}_4)}{\rho} = \frac{1000}{1,15} = 869,6 \text{ мл}$$

**Ответ.** 869,6

Отборочный (заочный) онлайн-этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
по общеобразовательному предмету Химия

**Критерии оценивания заданий:**

Максимальная сумма баллов за 7 заданий варианта составляет 100 баллов.

Распределение баллов по заданиям следующее:

| Номер задания | 8 класс | 9 класс |
|---------------|---------|---------|
| 1             | 10      | 10      |
| 2             | 10      | 10      |
| 3             | 10      | 10      |
| 4             | 15      | 15      |
| 5             | 15      | 15      |
| 6             | 20      | 20      |
| 7             | 20      | 20      |

За каждое задание выставляется либо максимальный балл в случае правильного ответа, либо 0, если ответ отсутствует или неверный.