


**Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 8 класса, 2021-2022 учебный год.**

**1.1.** *Прямые, содержащие биссектрисы внешних углов треугольника, в котором есть углы 42 и 59 градусов, попарно пересеклись и образовали новый треугольник. Найдите градусную меру его наибольшего угла.*

**Ответ:** 69

**Решение.** Обозначим вершины данного в условии треугольника за  $A, B, C$ , а его углы за  $\alpha, \beta$  и  $\gamma$ , соответственно. Кроме того, пусть  $A_1, B_1$  и  $C_1$  — точки пересечения биссектрис внешних углов  $B$  и  $C, A$  и  $C, A$  и  $B$ , соответственно. Тогда  $\angle B_1AC = \angle C_1AB = (180^\circ - \alpha)/2 = 90^\circ - \alpha/2$ . Аналогично  $\angle B_1CA = 90^\circ - \gamma/2$ . Тогда из суммы углов треугольника  $B_1AC$  находим  $\angle AB_1C = 180^\circ - (90^\circ - \alpha/2) - (90^\circ - \gamma/2) = \alpha/2 + \gamma/2$ . Следовательно, углы треугольника  $A_1B_1C_1$  — это полусуммы углов треугольника  $ABC$ . Очевидно, чтобы получить наибольший угол треугольника  $A_1B_1C_1$ , надо взять полусумму двух наибольших углов треугольника  $ABC$ . Углы  $ABC$  равны  $42^\circ, 59^\circ$  и  $79^\circ$ , поэтому наибольшая полусумма равна  $69^\circ$ .



**1.2.** *Прямые, содержащие биссектрисы внешних углов треугольника, в котором есть углы 55 и 46 градусов, попарно пересеклись и образовали новый треугольник. Найдите градусную меру его наибольшего угла.*

**Ответ:** 67

**1.3.** *Прямые, содержащие биссектрисы внешних углов треугольника, в котором есть углы 36 и 63 градусов, попарно пересеклись и образовали новый треугольник. Найдите градусную меру его наибольшего угла.*

**Ответ:** 72

**1.4.** *Прямые, содержащие биссектрисы внешних углов треугольника, в котором есть углы 71 и 40 градусов, попарно пересеклись и образовали новый треугольник. Найдите градусную меру его наибольшего угла.*


**Ответ:** 70

**1.5.** *Прямые, содержащие биссектрисы внешних углов треугольника, в котором есть углы 52 и 69 градусов, попарно пересеклись и образовали новый треугольник. Найдите градусную меру его наибольшего угла.*

**Ответ:** 64

**2.1.** При каком наибольшем  $k$  можно утверждать, что при любой покраске в чёрный цвет  $k$  клеток белого квадрата  $7 \times 7$  обязательно останется целиком белый квадрат  $3 \times 3$  со сторонами, идущими по линиям сетки?

**Ответ:** 3



**Решение.** Выделим четыре квадрата  $3 \times 3$ , примыкающие к углам квадрата  $7 \times 7$ . Эти квадраты не пересекаются, поэтому если закрашено не более трех клеток, то хотя бы один из этих квадратов остался целиком белым. Если же мы закрасим 4 клетки, отмеченные на рисунке серым, то ни одного белого квадрата  $3 \times 3$  не останется.

**2.2.** При каком наибольшем  $k$  можно утверждать, что при любой покраске в чёрный цвет  $k$  клеток белого прямоугольника  $7 \times 13$  обязательно останется целиком белый квадрат  $4 \times 4$  со сторонами, идущими по линиям сетки?

**Ответ:** 2

**2.3.** При каком наибольшем  $k$  можно утверждать, что при любой покраске в чёрный цвет  $k$  клеток белого прямоугольника  $10 \times 10$  обязательно останется целиком белый квадрат  $3 \times 3$  со сторонами, идущими по линиям сетки?

**Ответ:** 8

**2.4.** При каком наибольшем  $k$  можно утверждать, что при любой покраске в чёрный цвет  $k$  клеток белого прямоугольника  $7 \times 10$  обязательно останется целиком белый квадрат  $3 \times 3$  со сторонами, идущими по линиям сетки?

**Ответ:** 5

**2.5.** При каком наибольшем  $k$  можно утверждать, что при любой покраске в чёрный цвет  $k$  клеток белого прямоугольника  $8 \times 18$  обязательно останется целиком белый квадрат  $4 \times 4$  со сторонами, идущими по линиям сетки?

**Ответ:** 7

**3.1.** Из пункта  $A$  в пункт  $B$  вышел пешеход. Одновременно с ним из  $B$  в  $A$  выехал велосипедист. Через час пешеход находился от велосипедиста в 3 раза дальше, чем от пункта  $A$ . Еще через 30 мин произошла их встреча, после которой оба продолжили путь. Сколько часов занял путь пешехода от  $A$  до  $B$ ?

**Ответ:** 9

**Решение.** Пусть расстояние от  $A$  до  $B$  равно 1 км, пешеход движется со скоростью  $x$  км/ч, велосипедист —  $y$  км/ч. Тогда за час пешеход прошел  $x$  км, велосипедист проехал  $y$  км, и расстояние между ними равно  $1 - x - y$ , что должно быть в 3 раза больше  $x$ . Следовательно,  $3x = 1 - x - y$ ,  $y = 1 - 4x$ . За следующие полчаса они вместе преодолеют  $1 - x - y$  км. Так как скорость их сближения равна  $x + y$ , получаем уравнение  $\frac{1}{2}(x + y) = 1 - x - y$ , откуда  $x + y = \frac{2}{3}$ . Подставляем в последнее уравнение  $y = 1 - 4x$ :  $1 - 3x = \frac{2}{3}$ ,  $x = \frac{1}{9}$ . Следовательно, пешеходу потребуется 9 часов, чтобы преодолеть расстояние от  $A$  до  $B$ .

**3.2.** Из пункта  $A$  в пункт  $B$  вышел пешеход. Одновременно с ним из  $B$  в  $A$  выехал велосипедист. Через час пешеход находился от велосипедиста в 6 раз дальше, чем от пункта  $A$ . Еще через 1 час 30 мин произошла их встреча, после которой оба продолжили путь. Сколько часов занял путь пешехода от  $A$  до  $B$ ?

**Ответ:** 10

**3.3.** Из пункта  $A$  в пункт  $B$  вышел пешеход. Одновременно с ним из  $B$  в  $A$  выехал велосипедист. Через 2 часа пешеход находился от велосипедиста в 3 раза дальше, чем от пункта  $A$ . Еще через час произошла их встреча, после которой оба продолжили путь. Сколько часов занял путь пешехода от  $A$  до  $B$ ?

**Ответ:** 18

**3.4.** Из пункта  $A$  в пункт  $B$  вышел пешеход. Одновременно с ним из  $B$  в  $A$  выехал велосипедист. Через 2 часа пешеход находился от велосипедиста в 5 раз дальше, чем от пункта  $A$ . Еще через два часа произошла их встреча, после которой оба продолжили путь. Сколько часов занял путь велосипедиста от  $B$  до  $A$ ?

**Ответ:** 5

**3.5.** Из пункта  $A$  в пункт  $B$  вышел пешеход. Одновременно с ним из  $B$  в  $A$  выехал велосипедист. Через час пешеход находился от велосипедиста в 4 раза дальше, чем от пункта  $A$ . Еще через 40 мин произошла их встреча, после которой оба продолжили путь. Сколько часов занял путь велосипедиста от  $B$  до  $A$ ?

**Ответ:** 2

**4.1.** Петя написал на доске натуральное число  $A$ . Если его умножить на 8, то получится квадрат натурального числа. А сколько существует таких трёхзначных чисел  $B$ , для которых  $A \cdot B$  тоже является квадратом натурального числа?

**Ответ:** 15

**Решение.** Если  $8A$  — квадрат натурального числа, то любое простое число, большее 2, входит в  $A$  в четной степени, а двойка — в нечетной. Значит и в  $B$  любое простое число, большее 2, должно входить в четной степени, а двойка — в нечетной, то есть  $B$  должно иметь вид  $2x^2$ . Следовательно, нам надо найти количество таких  $x$ , что  $2x^2$  — трёхзначное. Другими словами,  $1000 > 2x^2 \geq 100$ ,  $500 > x^2 \geq 50$ . Подойдут  $x$  от 8 до 22, их  $22 - 7 = 15$ .

**4.2.** Петя написал на доске натуральное число  $A$ . Если его умножить на 27, то получится квадрат натурального числа. А сколько существует таких трёхзначных чисел  $B$ , для которых  $A \cdot B$  тоже является квадратом натурального числа?

**Ответ:** 13

**4.3.** Петя написал на доске натуральное число  $A$ . Если его умножить на 5, то получится квадрат натурального числа. А сколько существует таких трёхзначных чисел  $B$ , для которых  $A \cdot B$  тоже является квадратом натурального числа?

**Ответ:** 10

**4.4.** Петя написал на доске натуральное число  $A$ . Если его умножить на 12, то получится квадрат натурального числа. А сколько существует таких натуральных чисел  $1000 \leq B \leq 2000$ , для которых  $A \cdot B$  тоже является квадратом натурального числа?

**Ответ:** 7

**4.5.** Петя написал на доске натуральное число  $A$ . Если его умножить на 14, то получится квадрат натурального числа. А сколько существует таких трёхзначных чисел  $B$ , для которых  $A \cdot B$  тоже является квадратом натурального числа?

**Ответ:** 6

**5.1.** Сколько существует шестизначных чисел, состоящих только из цифр 1 и 2, если известно, что каждая из них встречается?

**Ответ:** 62

**Решение.** Всего существует  $64 = 2^6$  шестизначных чисел, состоящих из цифр 1 и 2, так как есть 6 позиций и на каждую из них по два варианта поставить цифру. Но два числа — состоящее только из единиц и состоящее только из двоек — не удовлетворяют условию, поэтому остается 62 числа.

**5.2.** Сколько существует пятизначных чисел, состоящих только из цифр 5 и 6, если известно, что каждая из них встречается?

**Ответ:** 30

**5.3.** Сколько существует семизначных чисел, состоящих только из цифр 3 и 8, если известно, что каждая из них встречается?

**Ответ:** 126

**5.4.** Сколько существует шестизначных чисел, состоящих только из цифр 7 и 8, причём 8 обязательно встречается?

**Ответ:** 63

**5.5.** Сколько существует семизначных чисел, состоящих только из цифр 8 и 9, причём 8 обязательно встречается?

**Ответ:** 127

**6.1.** Монеты бывают номиналов 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей. В кошельке лежит несколько монет. Известно, что какие бы 20 монет ни вытащить из кошелька, среди них будет хотя бы одна рублёвая, хотя бы одна двухрублёвая и хотя бы одна пятирублёвая. При каком наибольшем количестве монет в кошельке такое возможно?

**Ответ:** 28

**Решение.** Пример: 9 монет по 1 рублю, 9 монет по 2 рубля, 9 монет по 5 рублей и 1 монета по 10 рублей. Заметим, что в кошельке всего  $9+9+1=19$  монет достоинством не 1 рубль, поэтому среди любых 20 монет обязательно встретится рублевая. Аналогично проверяется и про все остальные номиналы.

Оценка: Предположим, что в кошельке лежит  $x$  монет. Так как монет достоинством не 1 рубль не больше 19 (иначе нашлось бы 20 монет, не содержащих рублевую), рублевых монет должно быть не менее  $x - 19$ . Аналогично двухрублевых и пятирублевых. Следовательно, всего монет не менее  $3(x - 19)$ . Получаем неравенство  $x \geq 3x - 57$ , откуда  $57 \geq 2x$ ,  $28,5 \geq x$ . Так как  $x$  — целое, оно не превосходит 28.

**6.2.** Монеты бывают номиналов 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей. В кошельке лежит несколько монет. Известно, что какие бы 30 монет ни вытащить из кошелька, среди них будет хотя бы одна двухрублёвая, хотя бы одна пятирублёвая и хотя бы одна десятирублёвая. При каком наибольшем количестве монет в кошельке такое возможно?

**Ответ:** 43

**6.3.** Монеты бывают номиналов 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей. В кошельке лежит несколько монет. Известно, что какие бы 26 монет ни вытащить из кошелька, среди них будет хотя бы одна рублёвая, хотя бы одна пятирублёвая и хотя бы одна десятирублёвая. При каком наибольшем количестве монет в кошельке такое возможно?

**Ответ:** 37

**6.4.** Монеты бывают номиналов 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей. В кошельке лежит несколько монет. Известно, что какие бы 28 монет ни вытащить из кошелька, среди них будет хотя бы одна рублёвая, хотя бы одна двухрублёвая и хотя бы одна десятирублёвая. При каком наибольшем количестве монет в кошельке такое возможно?

**Ответ:** 40

**6.5.** Монеты бывают номиналов 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей. В кошельке лежит несколько монет. Известно, что какие бы 24 монеты ни вытащить из кошелька, среди них будет хотя бы одна рублёвая, хотя бы одна двухрублёвая и хотя бы одна пятирублёвая. При каком наибольшем количестве монет в кошельке такое возможно?

**Ответ:** 34

**7.1.** В футбольном турнире участвовали 20 команд. Каждая сыграла один матч с каждой. За победу команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. После окончания турнира Вася посчитал сумму очков, набранных командами. Получилось 500. Какое количество матчей завершилось вничью?

**Ответ:** 70

**Решение.** Каждая команда сыграла 19 матчей, поэтому всего матчей было сыграно  $20 \cdot 19/2 = 190$  (делим пополам, так как каждый матч посчитан дважды). Если бы ничьих не было, то сумма очков была бы равна  $3 \cdot 190 = 570$ . Каждый ничейный матч приносит в сумму на одно очко меньше, чем матч, закончившийся победой одной из команд (сумма набранных очков равна 2, а не 3). Так как нам надо уменьшить сумму на 70 очков, ничейных матчей должно быть 70.

**7.2.** В футбольном турнире участвовали 20 команд. Каждая сыграла один матч с каждой. За победу команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. После окончания турнира Вася посчитал сумму очков, набранных командами. Получилось 400. Какое количество матчей завершилось победой одной из команд?

**Ответ:** 20

**7.3.** В футбольном турнире участвовали 25 команд. Каждая сыграла один матч с каждой. За победу команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. После окончания турнира Вася посчитал сумму очков, набранных командами. Получилось 740. Какое количество матчей завершилось вничью?

**Ответ:** 160

**7.4.** В футбольном турнире участвовали 40 команд. Каждая сыграла один матч с каждой. За победу команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. После окончания турнира Вася посчитал сумму очков, набранных командами. Получилось 1800. Какое количество матчей завершилось вничью?

**Ответ:** 540

**7.5.** В футбольном турнире участвовали 40 команд. Каждая сыграла один матч с каждой. За победу команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. После окончания турнира Вася посчитал сумму очков, набранных командами. Получилось 2000. Какое количество матчей завершилось вничью?

**Ответ:** 340

8.1. Действительное число  $a$  таково, что  $2a - 1/a = 3$ . Чему равно  $16a^4 + 1/a^4$ ?

**Ответ:** 161

**Решение.** Возведя равенство из условия в квадрат, получим  $4a^2 - 4 + 1/a^2 = 9$ , то есть  $4a^2 + 1/a^2 = 13$ . Ещё раз возводим в квадрат и получаем  $16a^4 + 8 + 1/a^4 = 169$ . Следовательно,  $16a^4 + 1/a^4 = 161$ .

8.2. Действительное число  $b$  таково, что  $b - 2/b = 5$ . Чему равно  $b^4 + 16/b^4$ ?

**Ответ:** 833

8.3. Действительное число  $x$  таково, что  $3x - 1/x = 3$ . Чему равно  $81x^4 + 1/x^4$ ?

**Ответ:** 207

8.4. Действительное число  $y$  таково, что  $y - 3/y = 5$ . Чему равно  $y^4 + 81/y^4$ ?

**Ответ:** 943

8.5. Действительное число  $z$  таково, что  $2z - 1/z = 4$ . Чему равно  $16z^4 + 1/z^4$ ?

**Ответ:** 392