

**Решения заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Новосибирской области по математике 2023-2024 г.г.
Решение каждой задачи олимпиады оценивается из 7 баллов**

11 класс

11.1. Доказать, что если для трёх ненулевых чисел x, y, z выполняются равенства

$$x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z} = z + \frac{1}{x}, \text{ то либо } x = y = z, \text{ либо } x^2 y^2 z^2 = 1.$$

Доказательство. Преобразуем равенства в условии. $x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z} \Leftrightarrow xyz + z = y^2 z + y$,

последнее эквивалентно $yz(x - y) = y - z$. Аналогично, из второго равенства получаем


$zx(y - z) = z - x$ и из равенства $x + \frac{1}{y} = z + \frac{1}{x}$ получаем $xy(x - z) = y - x$. Перемножим все

три равенства $x^2 y^2 z^2 (x - y)(y - z)(x - z) = (y - z)(z - x)(y - x)$. Если хотя бы одна скобка равна нулю, например $x = y$, то из равенства $yz(x - y) = y - z$ следует и $y = z$, в этом случае $x = y = z$. Если ни одна из скобок не равна 0, их можно сократить, получив вторую возможность $x^2 y^2 z^2 = 1$.

Критерии проверки. (●) Сделано преобразование $x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z} \Leftrightarrow yz(x - y) = y - z$: 2

балла (●) Выполнено перемножение трёх равенств: 2 балла. (●) Получен первый случай $x = y = z$: 1 балл. (●) Получен второй случай $x^2 y^2 z^2 = 1$: 2 балла.

11.2. Две окружности пересекаются в точках Р и Q, при этом центр O_1 первой окружности лежит вне второй, а центр O_2 второй окружности - вне первой. На первой окружности вне второй выбрана произвольная точка А, отличная от Р и Q, через неё проведены две прямые АР и АQ, пересекающие второй раз вторую окружность в точках В и С соответственно вне первой. Докажите, что прямые AO_1 и BC перпендикулярны.



Доказательство. Перпендикулярность прямых AO_1 и BC следует из того, что сумма величин углов ACB и CAO_1 равна 90° . Докажем последнее утверждение. Обозначим вторую точку пересечения прямой AO_1 с первой окружностью за Т, отметим, что отрезок AT – диаметр первой окружности и опирающийся на него угол APT – прямой. Разобьём его в сумму углов APQ и QPT . Углы QPT и $QAT = CAO_1$ равны, как вписанные в первую окружность и опирающийся в ней на общую хорду TQ . Четырёхугольник $QCSB$ вписан во вторую окружность, поэтому его угол $QCB = ACB$ равен 180° минус угол QPB , то есть равен смежному с последним углом APQ . Следовательно, сумма величин углов ACB и CAO_1 равна величине прямого угла APT , то есть 90° , что и требовалось доказать.

Критерии проверки. (●) Замечено, что перпендикулярность прямых AO_1 и BC следует из того, что сумма величин углов ACB и CAO_1 равна 90° : 1 балл. (●) Замечено, что AT – диаметр первой окружности и опирающийся на него угол APT – прямой: 1 балл. (●) Показано равенство углов QPT и $QAT=CAO_1$: 1 балл. (●) Показано равенство углов $QCB=ACB$ и APQ : 2 балла. (●) Показано, что сумма величин углов ACB и CAO_1 равна величине прямого угла APT : 2 балла.

11.3. В турнире по олимпийской системе участвуют 8 борцов одинаковой силы, среди которых есть Вася и Петя. Их случайным образом разбивают на 4 пары, после чего победителей в каждой паре также случайно разбивают на две пары, победители которых встречаются в финале. В каждой схватке каждый из борцов побеждает другого с вероятностью ровно $\frac{1}{2}$. Какова вероятность того, что Вася и Петя встретятся между собой в ходе турнира?

Ответ. $\frac{1}{4}$.

Решение. Занумеруем борцов так, чтобы в финале встретились победитель среди борцов 1,2,3,4 и победитель среди борцов 5,6,7,8, а в полуфинале – победитель пары 1,2 с победителем пары 3,4, и победитель пары 5,6 с победителем пары 7,8. Всего имеется $8!$ случаев распределения 8 борцов по этим 8 номерам. Рассмотрим все три случая, когда Вася и Петя таки могли встретиться в турнире.

1) Вася и Петя встретились в первой схватке. Это могло произойти, если они были распределены в одну из пар номеров (1,2),(3,4),(5,6),(7,8), что могло произойти $4 \cdot 2 \cdot 6!$ способами – каждый из них в одной из 4 пар двумя способами и остальные 6 по 6 оставшимся номерам $6!$ способами.

2) Вася и Петя встретились во второй схватке. Это могло произойти, если они были распределены в разные пары номеров $\{1,2\}, \{3,4\}$ из первой четвёрки (1,2,3,4) или в разные пары номеров $\{5,6\}, \{7,8\}$ из второй четвёрки (5,6,7,8) и оба победили в своих первых схватках. Это могло произойти $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 6! = 16 \cdot 6!$ способами, число которых нужно умножить на вероятность $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ выигрыша обоими своими первых схваток, что в итоге даёт $4 \cdot 6!$.

3) Вася и Петя встретились в третьей схватке. Это могло произойти, если они были распределены в разные четвёрки $\{1,2,3,4\}$ и $\{5,6,7,8\}$ и оба победили в своих первых двух схватках. Это могло произойти $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6! = 32 \cdot 6!$ способами, число которых нужно умножить на вероятность $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ выигрыша обоими двух своих первых схваток, что в итоге даёт $2 \cdot 6!$.

Сумму чисел благоприятных исходов во всех трёх случаях делим на общее число возможностей, получаем ответ: $\frac{8 \cdot 6! + 4 \cdot 6! + 2 \cdot 6!}{8!} = \frac{8 + 4 + 2}{7 \cdot 8} = \frac{1}{4}$.

Критерии проверки. (●). Рассмотрение трёх случаев: 1 балл. (●) Верная схема комбинаторного подсчёта количества возможных случаев в каждом из случаев 1), 2), 3): по 1 баллу за каждый (●) Верное умножение на $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{16}$ во втором и третьем случаях: по 1 баллу за каждый. (●). Верное деление суммы чисел благоприятных исходов во всех трёх случаях на общее число возможностей: 1 балл.

11.4. Найти все натуральные N такие, что числа $4N-3$ и $9N+1$ являются квадратами натуральных чисел.

Ответ. $N=7$.

Решение 1. Обозначим $4N-3=x^2$ и $9N+1=y^2$, тогда $4y^2-9x^2=(2y+3x)(2y-3x)=31$. Число 31 разлагается в произведение двух натуральных множителей единственным способом, поэтому $2y+3x=31$, $2y-3x=1$, откуда $x=5$, $y=8$, $N=7$.

Решение 2. Обозначим $4N-3=x^2$ и $9N+1=y^2$, тогда $9N=y^2-1=(y-1)(y+1)$. Оба числа $y-1$ и $y+1$ делятся на 3 одновременно не могут, поэтому ровно одно из них делится на 3 и на 9.

а) Пусть $y-1$ делится на 9, тогда $y=9t+1$, а $N=(9t+2)t$. Следовательно, $x^2=4N-3=4(9t+2)t-3=36t^2+8t-3>36t^2$. Но следующий за точным квадратом $(6t)^2=36t^2$ точный квадрат $(6t+1)^2=36t^2+12t+1$ уже будет больше $36t^2+8t-3$, поэтому такое невозможно.

б) Пусть $y+1$ делится на 9, тогда $y=9t-1$, а $N=(9t-2)t$. Следовательно, $x^2=4N-3=4(9t-2)t-3=36t^2-8t-3<36t^2$. Предшествующий точному квадрату $(6t)^2=36t^2$ точный квадрат $(6t-1)^2=36t^2-12t+1$ может равняться $36t^2-8t-3$ при $t=1$, что даёт решение $N=7$. А вот квадрат $(6t-2)^2=36t^2-24t+4$ уже меньше $36t^2-8t-3$, поэтому больше решений нет.

Критерии проверки. (●) Угадан правильный ответ $N=7$ 1 балл.

В решении 1 (●) Получено равенство $4y^2-9x^2=31$: 3 балла. 1 (●) Сделано разложение $4y^2-9x^2=(2y+3x)(2y-3x)=31$: 1 балл. (●) Получена система $2y+3x=31$, $2y-3x=1$: 2 балла.

В решении 2 (●) Показано, что $(y-1)(y+1)$ делится на 9: 1 балл. (●) Показано, что одно из чисел $y-1$ и $y+1$ на 9: 1 балл. (●) Показано, что $N=(9t\pm 2)t$: 1 балл. (●) Правильное рассмотрение каждого из пунктов а) и б): по 2 балла.

11.5. Каждое из натуральных чисел от 1 до n окрасили в красный или синий цвет и подсчитали среднее арифметическое красных чисел и среднее арифметическое синих чисел. После этого одно из красных чисел перекрасили в синий цвет, после чего среднее арифметическое красных чисел и среднее арифметическое синих чисел одновременно увеличились на одно и то же число x . Найти максимальное значение x .

Ответ. $\frac{1}{2}$.

Решение. Обозначим за α и β средние арифметические красных и синих чисел до перекраски соответственно, за t - перекрашенное число, и за k - количество красных чисел сначала. По условию, $\alpha k - t = (\alpha + x)(k - 1)$, откуда $t = \alpha - x(k - 1)$. Аналогично, $\beta(n - k) + t = (\beta + x)(n - k + 1)$, откуда $t = x(n - k + 1) + \beta$. Приравняем

$\alpha - x(k - 1) = x(n - k + 1) + \beta$, получаем $x = \frac{\alpha - \beta}{n}$. При фиксированном k максимальное

среднее арифметическое значение любых k чисел из интервала от 1 до n не превосходит среднего арифметического k максимальных чисел $n - k + 1, \dots, n - 1, n$, то есть

$\alpha \leq \frac{n - k + 1 + \dots + n - 1 + n}{k} = \frac{2n - k + 1}{2}$. Аналогично, при фиксированном k минимальное

среднее арифметическое значение любых $n - k$ чисел из интервала от 1 до n не меньше

среднего арифметического $n-k$ минимальных чисел $1, 2, \dots, n-k$, то есть $\beta \leq \frac{1+2+\dots+n-k}{k} = \frac{n-k+1}{2}$. Следовательно, $x = \frac{\alpha - \beta}{n} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{2n-k+1}{2} - \frac{n-k+1}{2} \right) = \frac{1}{2}$.

Пример. Если в красный цвет покрашены числа $n-k+1, \dots, n-1, n$, а в синий – числа $1, 2, \dots, n-k$, то до перекраски их средние арифметические равнялись $\alpha = \frac{2n-k+1}{2}$ и

$\beta = \frac{n-k+1}{2}$ соответственно. После перекраски числа $n-k+1$ в синий цвет, эти средние станут равны $\alpha' = \frac{2n-(k-1)+1}{2} = \frac{2n-k+2}{2} = \alpha + \frac{1}{2}$ и $\beta' = \frac{n-(k-1)+1}{2} = \frac{n-k+2}{2} = \beta + \frac{1}{2}$, соответственно, оба увеличатся на $\frac{1}{2}$.

Критерии проверки. (●) Приведён правильный ответ и пример, на котором он достигается: 2 балла. (●) Вычисления оценки доведены только до выражения $x = \frac{\alpha - \beta}{n}$: 2 балла. (●) Доказано, что $\frac{\alpha - \beta}{n} \leq \frac{1}{2}$: 3 балла. (●) Отсутствует проверка примера: минус 1 балл.