

Десятый класс

Решение задачи 10-1 (автор: Андреев М.Н.)

Определим металл. Предположим, что после сжигания образовался оксид Me_2O_x массой 3.2 г из соответственно $5.6/2=2.8$ г металла. Составим уравнение

$$2.8 / 3.2 = 2M / (2M + 16x), M = 56x$$

x	M	X	комментарий
1	56	Fe	не подходит, т.к. нет валентности 1
2	112	Cd	подходит
3	168	-	
4	224	Fr	

$v(\text{Cd}) = 2.8 / 112 = 0.025$ моль. Найдем молярную массу Y в расчете на 1 Cd:

$M(Y) = 3.6 / 0.025 = 144$ г/моль, $144 - 112 = 32$ что вместе с желтым цветом вещества свидетельствует о сере. Также увеличение массы известковой воды соответствует 0,025 моль сернистого газа: $v(\text{SO}_2) = 1.6 / 64 = 0.025$ моль

Найдём среднюю молярную массу газов после сгорания $M = 2 \cdot 29 = 58$ г/моль. Её могут составлять углекислый и сернистый газы, вызывающие помутнение известковой воды. Пусть $v(\text{CO}_2) = y$, а $v(\text{SO}_2) = z$ составим систему уравнений

$$\begin{cases} 44y + 64z = 14.5 \\ y + z = 14.5 / 58 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0.075 \\ z = 0.175 \end{cases}$$

$v(\text{CO}_2) = 0.075$ моль , а $v(\text{SO}_2) = 0.175$ моль из которых 0.025 моль образовалось из серы, тогда $v(\text{C}) : v(\text{S}) = v(\text{CO}_2) : v(\text{SO}_2) = 0.075 : 0.150 = 1 : 2$. Это соответствует 0.075 моль CS_2 .

Проверим по массе исходной жидкости

$$m(\text{S}) + m(\text{CS}_2) = 0.025 \cdot 32 + 0.075 \cdot 76 = 6.5 \text{ г}$$

Количественный состав жидкости может быть выражен:

	мольн. %	масс.%
S	25	12.3
CS_2	75	87.7

Уравнения реакций:

- 1) $\text{Cd} + \text{S} = \text{CdS}$
- 2) $2\text{CdS} + 3\text{O}_2 = 2\text{CdO} + 2\text{SO}_2$
- 3) $\text{CS}_2 + 3\text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2\text{SO}_2$
- 4) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- 5) $\text{SO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaSO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

X – Cd, Y – CdS и Z – CdO

Система оценивания:

1	Веществ X, Y и Z по 2 балла	6 баллов
2	Качественный состав жидкости (указание на сероуглерод и серу по 1 баллу) Количественный состав раствора серы в сероуглероде (принимаются и массовые, и мольные доли) – 2 балла	4 балла
3	Уравнения 1-5 по 1 баллу	5 баллов
ИТОГО: 15 баллов		

Решение задачи 10-2 (автор: Просвирина А.П.)

1. Из перечисленных сфер применения металла **X** можно предположить, что это никель. Никель в земной коре представлен в основном в виде сульфидов и арсенидов, так что можем проверить вывод расчетом:

$$v(Ni) = \frac{87.81}{0.6 \cdot 58.7} = 2.493 \text{ моль}$$

При обжиге неизвестного минерала металл переходит в наиболее устойчивый оксид – NiO . Допустим, что **Z** содержит 1 атом никеля, тогда:

$$v(Z) = n(NiO) = n(Ni) = 2.493 \text{ моль}$$

$$M(Z) = \frac{500 \cdot 2}{2.493 \cdot 3} = 133.7 \text{ г/моль}$$

Под полученнную молярную массу идеально подходит минерал никелин – арсенид никеля NiAs . Тогда **X** – Ni, **A** – NiO , **Z** – NiAs .

Попытка выделение металла **Y** с помощью железного гвоздя позволяет предположить, что **Y** – металл, расположенный правее водорода в ряду напряжения металлов. Из 3d металлов таким является только медь.

2. Соединения никеля придают стеклам зеленый цвет.

3. Присоединить к металлу и отщепить от него из хорошо известных ядовитых газов можно только угарный газ **C** – CO, в результате получится легколетучая жидкость **B** – Ni(CO)₄. Карбонил никеля имеет тетраэдрическое строение.

Количество CO в карбониле никеля можно определить с помощью правила 18 электронов: никель в степени окисления 0 имеет 10 электронов, для заполнения оболочки инертного газа ему не хватает 8 электронов, которые он может взять из 4 молекул CO.

4. Уравнения реакций:


- 1) $3\text{NiAs} + 7\text{HNO}_3 + 6\text{HCl} = 3\text{NiCl}_2 + 7\text{NO} + 3\text{H}_3\text{AsO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
- 2) $4\text{NiAs} + 5\text{O}_2 = 4\text{NiO} + 2\text{As}_2\text{O}_3$
- 3) $\text{NiO} + \text{C} = \text{Ni} + \text{CO}$
- 4) $\text{Ni} + 4\text{CO} = \text{Ni}(\text{CO})_4$

Система оценивания:


1.	Определение металлов X и Y по 2 балла Определение соединений A – C по 1 баллу. Определение Z – 1 балл	8 баллов
2.	Указание на зелёный цвет стекла	1 балл
3.	Изображение связей Ni-C – 1 балл Указание на тетраэдрическое строение – 1 балл	2 балла
4.	Уравнения реакций 1 – 4 по 1 баллу.	4 балла
Итого: 15 баллов		

Решение задачи 10-3 (автор: Болматенков Д.Н.)


Атомов водорода в искомой кислоте – 3, однако к кислотной диссоциации способен лишь один из них. Такое наблюдается, когда оставшиеся атомы водорода находятся не в составе OH-групп, а напрямую связаны с атомами с низкой электроотрицательностью. Это реализуется, например, в органических кислотах (CH₃COOH). В неорганике самым известным примером подобного являются низшие кислоты фосфора. Под описание подходит **фосфорноватистая кислота H₃PO₂**. При наличии аргументации подходят и




другие неорганические кислоты, содержащие два неподвижных и один подвижный атом водорода и стабильные в водном растворе.



Однако кажущаяся основность кислоты 3 реализуется и в других случаях. Одним из широко известных примеров такого типа является **борная кислота** H_3BO_3 , действующая в растворе не как донор протона, а как акцептор гидроксид-иона:



Стоит отметить, что за счёт частичной олигомеризации борная кислота способна проявлять и более высокую основность, что реализуется в концентрированных щелочных растворах.



Последняя кислота удовлетворяет условию только по качественным показателям (реальная и кажущаяся основность), однако проявляет довольно низкую кислотность и не позволяет достичь приведённой в условии величины pH.

Среди рассматриваемых растворов достаточно кислая, чтобы можно было пренебречь присутствием гидроксид-ионов. Тогда набор уравнений, описывающая раствор, будет выглядеть следующим образом:

$$[\text{H}^+] = [\text{X}^-]$$

$$C = [\text{X}^-] + [\text{HX}]$$

$$K = \frac{[\text{X}^-][\text{H}^+]}{[\text{HX}]}$$

что после преобразований сводится к уравнению вида:

$$K = \frac{[\text{H}^+]^2}{C - [\text{H}^+]}$$

Это квадратное уравнение и даёт результат, полученный Петей в самом

конце.

В случае слабо выраженной диссоциации кислоты концентрация протонов в растворе мала по сравнению с аналитической концентрацией кислоты (что эквивалентно условию $C \approx [HA]$). В этом случае квадратное уравнение упрощается следующим образом:

$$K = \frac{[H^+]^2}{C} \text{ или } [H^+] = \sqrt{K \cdot C}$$

Последняя формула хорошо работает в концентрированных растворах слабых кислот, но, по-видимому, одно из этих условий в задаче нарушается. Именно это противоречие и обнаружил В.И. во втором по счёту решении Пети.

Используя верную ($[H^+]_v = 10^{-1.265} = 0.0323$) и неверную ($[H^+]_{neb} = 10^{-1.265} = 0.0543$) концентрации, запишем систему уравнений:


$$K = \frac{[H^+]_v^2}{C - [H^+]_v}$$

$$K = \frac{[H^+]_{neb}^2}{C}$$


Система имеет решение при $C = 0.05$ и $K = 0.059$. Константа кислотности H_3PO_2 достаточно высока, что и привело к ошибке при использовании приближённой формулы.

Стоит отметить, что аналогичные рассуждения могут быть проведены с использованием величины степени диссоциации кислоты (α), что также оценивается полным баллом.

pH водного раствора NaX отличается от 7 за счёт гидролиза. В растворе создаётся концентрация гидроксид-ионов, равная $[OH^-] = 10^{(14-7.5)} = 10^{-6.5}$. Стоит учесть, что при такой низкой концентрации гидроксид-ионов нельзя игнорировать автопротолиз воды и пренебрегать ионами H^+ . Запишем уравнение электронейтральности:



И уравнение материального баланса:



С учётом известных концентраций $[H^+]$ и $[OH^-]$ найдём концентрацию $[HX]$:

$$[\text{HX}] = [\text{OH}^-] - [\text{H}^+] = 2.85 \cdot 10^{-7}$$

и подставим полученную величину в уравнение для константы кислотности, чтобы найти $[\text{X}^-]$:

$$[\text{X}^-] = \frac{K[\text{HX}]}{[\text{H}^+]} = \frac{0.059 \cdot 2.85 \cdot 10^{-7}}{10^{-7.5}} = 0.532$$

Тогда аналитическая концентрация соли равна $C_0 = [\text{X}^-] + [\text{HX}] \approx [\text{X}^-] = 0.532 \text{ М}$.

Рассмотрим 1 л раствора соли. Данный раствор содержит $1000 \cdot 1.04 \cdot 0.045 = 46 \text{ г соли}$, а её молярная масса равна $46.8 / 0.532 = 88 \text{ г/моль}$. За вычетом натрия и двух атомов водорода получим остаток 63 г/моль. Предположив, что кислота кислородсодержащая, получим для двух атомов кислорода формулу H_3PO_2 .

При полной диссоциации трёхосновной кислоты концентрацией 0.05 М образуется 0.15 М протонов. Величина рН составит 0.82(4).

Система оценивания:


1	Брутто-формулы двух кислот, удовлетворяющих условию, с обоснованием их кажущейся и реальной основности (без обоснования – 0 б) по 1 баллу Структурные формулы нейтральной и анионной форм каждой из кислот по 0.5 балла	4 балла
2	Запись квадратного уравнения относительно $[\text{H}^+]$ или α – 1 балл Запись упрощённой формы квадратного уравнения относительно $[\text{H}^+]$ или α – 1 балл Запись системы уравнений для расчёта К и С – 1 балл Верное значение С – 1 балл Верное значение К – 1 балл	5 баллов
3	Расчёт аналитической концентрации соли – 3 балла Молярная масса соли – 1 балл Формула кислоты – 1 балл	5 баллов
4	Расчёт рН H_3PO_2 в допущении, что кислота сильная и трёхосновная	1 балл
Итого 15 баллов		

Решение задачи 10-4 (автор: Курамшин Б. К.)

- Четырех- и двухатомные молекулы в газовой фазе существуют для фосфора и его аналога – мышьяка.

В качестве верных принимаются ответы сера, селен и теллур – в газообразном состоянии они также существуют в виде сложной смеси молекул (правда, содержащей большее разнообразие частиц, таких как S_n , $n = 1 \dots 8$).


Структурные формулы молекул As_4 и As_2 аналогичны структуре P_4 и N_2 :



2. Выражения для констант равновесия:

$$K_1 = \frac{d}{m^2}; \quad K_2 = \frac{t}{d^2}.$$

3. При больших давлениях, согласно принципу Ле Шателье, оба равновесия сдвинуты вправо, значит, в пределе больших давления мольная доля A_4 стремится к 1, а A и A_2 – к нулю. Наоборот, в пределе малых давлений мольная доля A стремится к 1, а A_2 и A_4 – к нулю. Для A_2 , таким образом, зависимость проходит через максимум.



4. Равновесное общее давление p складывается из давлений 3 компонентов, при этом d и t легко выражаются через константы равновесия и m .

$$d = K_1 m^2; \quad t = K_2 d^2 = K_2 K_1^2 m^4$$

$$p = m + d + t = m + K_1 m^2 + K_2 K_1^2 m^4.$$

Начальное давление – это давление чистого тетрамера. Поскольку каждый тетramer дает либо 1 молекулу A_4 , либо 2 молекулы A_2 , либо 4 молекулы A в равновесии, то:

$$p_0 = \frac{m}{4} + \frac{d}{2} + t = \frac{m}{4} + \frac{K_1 m^2}{2} + K_2 K_1^2 m^4.$$

5. Видно, что m в экспериментальных выражениях выражено через разность

давлений. Выразим из нее m строго.

$$p - p_0 = \frac{3m}{4} + \frac{K_1 m^2}{2}$$

$$\frac{K_1 m^2}{2} + \frac{3m}{4} - (p - p_0) = 0$$

Дискриминант квадратного уравнения:

$$D = \frac{9}{16} + 4 \cdot \frac{K_1}{2} \cdot (p - p_0) = \frac{9}{16} \cdot \left(1 + \frac{32}{9} K_1 (p - p_0) \right).$$

Положительный корень уравнения:

$$m = \frac{-\frac{3}{4} + \sqrt{\frac{9}{16} \cdot \left(1 + \frac{32}{9} K_1 (p - p_0) \right)}}{K_1} = \frac{3}{4K_1} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{32}{9} K_1 (p - p_0)} \right).$$

Упростим выражение с учетом приведенного в условии приближения:

$$m \approx \frac{3}{4K_1} \left(-1 + 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{9} K_1 (p - p_0) - \frac{1}{8} \cdot \frac{32^2}{9^2} K_1^2 (p - p_0)^2 \right).$$

$$m \approx \frac{4}{3} (p - p_0) - \frac{32}{27} K_1 (p - p_0)^2.$$

Видно, что коэффициент при первой степени разности давлений не зависит от температуры и составляет $4/3$, то есть $\alpha = 1.33$.

Рассчитаем константы равновесия из коэффициентов при квадратах разностей давлений:

$$K_{1,1030} = 10.2 \cdot 27 / 32 = 8.61;$$

$$K_{1,1050} = 4.18 \cdot 27 / 32 = 3.52.$$

Затем рассчитаем энталпию и энтропию реакции:

$$\Delta_r H^\circ = \frac{RT_1 T_2}{T_2 - T_1} \ln \frac{K_{1,1050}}{K_{1,1030}} = \frac{8.314 \cdot 1030 \cdot 1050}{1050 - 1030} \ln \frac{3.52}{8.61} = -402.1 \text{ кДж / моль}$$

$$\Delta_r G^\circ_{1030} = -8.314 \cdot 1030 \cdot \ln 8.61 = -18436 \text{ Дж/моль}$$

$$\Delta_r S^\circ = \frac{\Delta_r H^\circ - \Delta_r G^\circ}{T} = \frac{-402100 + 18436}{1030} = -372 \text{ Дж / (моль · К)}.$$

Система оценивания:


1	2 примера элемента А – по 0.5 балла Структурные формулы 2 молекул (<i>для любого из двух элементов</i>) – по 0.5 балла	2 балла
2	Выражения для 2 констант равновесия – по 1 баллу	2 балла
3	Указание на графике пределов при малых p для каждой из мольных долей – 1 балл (<i>Если при малых p какой-то из графиков имеет неверный предел – 0 баллов</i>) Указание на графиках пределов при больших p – 1 балл (<i>Если при малых p какой-то из графиков имеет неверный предел – 0 баллов</i>) Указание прохождения через максимум доли димера – 1 балл	3 балла
4	2 выражения – по 1.5 балла (<i>Если не приведены выкладки – 0 баллов;</i> <i>Если верно получены выражения через t, d, t, но неверны итоговые выражения – по 1 баллу</i>).)	3 балла
5	Значение α – 1 балл (<i>Если нет выкладок – 0 баллов</i>) Значения 2 констант равновесия – по 1 баллу (<i>Если нет выкладок – 0 баллов</i>) Значения энталпии и энтропии реакции – по 1 баллу (<i>верное решение иным способом – полный балл,</i> <i>Если нет выкладок – 0 баллов</i>)	5 баллов
Итого: 15 баллов		

Решение задачи 10-5 (автор: Качмаржик А.Д.)

1. Из условий задачи можно определить эквивалентную молярную массу X, для этого необходимо узнать, сколько моль иода пошло на реакцию с X. Итак, общее количество иода:

$$v_{\text{общ}}(I_2) = \frac{0.240 \text{ г/л} \cdot 0.150 \text{ л}}{253.8 \text{ г/моль}} = 1.42 \cdot 10^{-4} \text{ моль}$$

Иод реагирует с тиосульфатом по уравнению



Количество вещества тиосульфата:

$$v(Na_2S_2O_3) = 0.00800 \text{ л} \cdot 0.0105 \text{ моль/л} = 8.40 \cdot 10^{-5} \text{ моль}$$

Тогда количество вещества иода, пошедшего на реакцию с X, равно:

$$v(I_2) = 1.42 \cdot 10^{-4} - \frac{1}{2} \cdot 8.4 \cdot 10^{-5} = 1.00 \cdot 10^{-4} \text{ моль}$$


Эквивалентная молярная масса **X**:

$$M_{\text{экв}}(X) = \frac{m(X)}{2 \cdot v(I_2)} = \frac{3.0 \cdot 10^{-3} \text{ г}}{2 \cdot 1.00 \cdot 10^{-4} \text{ моль}} = 15 \text{ г/моль}$$

С учётом того, что в условии говорится про электрофильные свойства, но не говорится о нуклеофильных, а также исходя из представленных на схеме реакций, можно предположить, что это формальдегид (CH_2O), для окисления которого в формиат необходимо 2 электрона, а $15 \cdot 2 = 30$ г/моль, что соответствует его молярной массе. Формальдегид реагирует с щелочным раствором иода согласно уравнению




2. Превращения, описанные в задаче, возможны благодаря окислительным, восстановительным и электрофильным свойствам формальдегида. Так, при восстановлении формальдегида водородом на никеле образуется метанол **B**, при окислении перманганатом калия в кислой среде – углекислый газ **D**, а при окислении гидроксидом меди – муравьиная кислота **L**. При взаимодействии формальдегида с синильной кислотой (цианид – нуклеофил) образуется циангидрин **A**, при взаимодействии с гидразином – гидразон **J**, а с фенилмагнийбромидом формальдегид реагирует с образованием бензилового спирта **K**. С аммиаком формальдегид даёт уротропин **N**. С метанолом в щелочной среде формальдегид образует полуацеталь **H**, а с избытком метанола – ацеталь **I**. Взаимодействие метанола с хлороводородом в присутствии хлорида цинка приводит к образованию метилхлорида **C**. Углекислый газ реагирует с углеродом при нагревании с образованием монооксида углерода **E**. Дальнейшая реакция с хлором в присутствии активированного угля даёт фосген **F**. Взаимодействие фосгена с избытком метанола приводит к образованию диметилкарбоната **G**. Из муравьиной кислоты под действием метанола в кислой среде получается метилформиат **M**. Решение продублировано на схеме:



Уравнение взаимодействия CH₂O с перманганатом калия:



3. При длительном хранении формальдегид полимеризуется, образуя параформ. При взаимодействии фенола с формальдегидом получаются фенолформальдегидные смолы. В качестве верной структуры можно считать вариант с замещением атомов Н в двух *ортого*-положениях к OH-группе фенола, вариант с замещением в *ортого*- и *пара*-положениях, а также варианты с замещением во всех трёх положениях.



Система оценивания:

1.	Два уравнения реакций по 0.75 балла, вещество X – 1 балл	2.5 балла
2.	Структуры веществ A – C и F – N – по 0.75 балла Структуры веществ D и E – по 0.5 балла Уравнение реакции – 1 балл <i>В качестве правильного ответа засчитываются как структурные формулы, так и молекулярные формулы, но при условии, что они записаны так, что по ним однозначно считывается структура соединения (например, C₆H₅CH₂OH или HCOOCH₃)</i>	11 баллов
3.	Элементарные звенья параформа и фенолформальдегидной смолы – по 0.75 балла	1.5 балла
	ИТОГО:	15 баллов